

## Додаток 1

до Положення про застосування Національного переліку основних лікарських засобів під час організації процесу забезпечення населення лікарськими засобами в закладах і установах охорони здоров'я, що повністю або частково фінансуються з державного та місцевих бюджетів (пункт 3)

### ОСОБЛИВОСТІ

медичного застосування лікарських засобів, включених до Національного переліку основних лікарських засобів

Клас, група, підгрупа, міжнародна непатентована назва (МНН) українською та англійською мовами	Особливості медичного застосування
<b>I. Анестетики</b>	
<b>2. Місцеві анестетики</b>	
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Ефедрин (Ephedrine)</i>	* Для спинномозкової анестезії під час пологів з метою профілактики гіпотензії
<b>II. Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги</b>	
<b>1. Ненаркотичні анальгетики та нестероїдні протизапальні лікарські засоби (НПЗЗ)</b>	
Ібупрофен (Ibuprofen)	<input checked="" type="checkbox"/> Не призначати дітям до 3 місяців.
Парацетамол (Paracetamol)	* Не рекомендується застосовувати як нестероїдний протизапальний засіб
<b>2. Опіодні анальгетики</b>	
Фентаніл (Fentanyl)	* Для купування больового синдрому при онкологічних захворюваннях та усунення периопераційного болю
<i>Додатковий перелік</i>	
<i>Метадон (Methadone)</i>	* Для лікування онкологічного болю
<b>3. Лікарські засоби для симптоматичної фармакотерапії у паліативній допомозі / Лікарські засоби для усунення інших поширених симптомів у паліативній допомозі</b>	
Флуоксетин (Fluoxetine)	<input checked="" type="checkbox"/> >8 років
Ондансетрон (Ondansetron)	<input checked="" type="checkbox"/> >1 місяця

<b>III. Протиалергічні лікарські засоби та лікарські засоби, що використовуються при анафілаксії</b>	
Лоратадин (Loratadine)	* H1-гістаміноблокатори першого покоління. Не рекомендується застосовувати при анафілаксії
<b>V. Протисудомні/протиепілептичні засоби</b>	
Магнію сульфат (Magnesium sulfate)	* Для медичного застосування при еклампсії та важкій пре еклампсії. Не застосовується при інших видах судом
Мідазолам (Midazolam)	* Ампула: 1 мг/мл; 10 мг/мл Для букального введення у випадку, коли оромукозний розчин недоступний
Ламотриджин (Lamotrigine)	* Як додаткова терапія для лікування резистентних часткових або генералізованих судом
<b>VI. Протиінфекційні лікарські засоби</b>	
<b>1. Антигельмінтні лікарські засоби</b>	
<i>Додатковий перелік</i>	
Оксамніхін (Oxantiquine)	* Призначається у разі, якщо лікування празиквантелом не є ефективним
<b>2. Антибактеріальні лікарські засоби</b>	
<b>Бета-лактамі антибіотики</b>	
Цефазолін (Cefazolin)	* в тому числі і для хірургічної профілактики <input checked="" type="checkbox"/> >1 місяця
Цефіксим (Cefixime)	* рекомендовано для лікування однією дозою неускладненої аногенітальної гонореї
Цефтріаксон (Ceftriaxone)	* Не призначається разом з кальцієм та новонародженим з гіпербілірубінемією <input checked="" type="checkbox"/> >41 тиждень гестаційного віку
Прокаїну бензилпеніцилін (Procaine benzylpenicillin)	* Не рекомендований як лікарський засіб першої лінії терапії для лікування неонатального сепсису, окрім як за умови високої смертності новонароджених під професійним наглядом у випадках, коли лікування у лікарні неможливе
Піперацилін + Тазобактам (Piperacillin and enzyme inhibitor)	ПРЕПАРАТ ПЕРШОГО ВИБОРУ - ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі) - високий ризик фебрильної нейтропенії - госпітальна пневмонія * Група антибіотиків, що використовуються з обережністю

<b>Додатковий перелік</b>	
<i>Цефотаксим (Cefotaxime)</i>	* Цефалоспорины 3-го покоління є лікарськими засобами вибору для медичного застосування у госпіталізованих новонароджених
<i>Імпінем + Циластатин (Imipenem + Cilastatin)</i>	* Лише для лікування внутрішньолікарняних інфекцій, що загрожують життю, через підозрювану або доведену інфекцію, резистентну до комбінованої терапії
<i>Меропенем (Meropenem)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> >3 місяців. * Імпінем + циластатин як альтернатива, окрім гострих бактеріальних менінгітів, при яких препаратом вибору є меропенем * Група антибіотиків, що використовуються з обережністю <b>ПРЕПАРАТ ДРУГОЇ ЛІНІЇ</b> - гострий бактеріальний менінгіт у новонароджених [сп] - ускладнені внутрішньочеревні інфекції (тяжкі) - високий ризик фебрильної нейтропенії
<i>Даптоміцин (Daptomycin)</i>	* Резервний антибіотик
<i>Лінезолід (Linezolid)</i>	* Резервний антибіотик
<i>Колістим (Colistin)</i>	* Резервний антибіотик
<i>Фосфоміцин (Fosfomycin)</i>	* Резервний антибіотик
<i>Цефепім (Cefepime)</i>	* Резервний антибіотик
<b>Інші антибактеріальні лікарські засоби</b>	
<i>Азитроміцин (Azithromycin)</i>	* в тому числі для лікування трахоми одноразовою дозою
<i>Хлорамфенікол (Chloramphenicol)</i>	* Олійна суспензія для ін'єкцій по 0.5 г (у вигляді натрію сукцинату)/мл по 2 мл в ампулах Лише для пробного лікування епідемічного менінгіту у дітей > 2 років
<i>Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin)</i>	* Для дорослих та дітей віком від 14 років
<i>Кларитроміцин (Clarithromycin)</i>	* також для комбінованої терапії з метою ерадикації <i>H. Pylori</i> у дорослих

Доксициклін (Doxycycline)	<input checked="" type="checkbox"/> Використання у дітей віком до 8 років допустиме лише для лікування інфекцій, що загрожують життю, за відсутності альтернатив
<b>Протитуберкульозні лікарські засоби</b>	
Рифабутин (Rifabutin)	* Лише для медичного застосування у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією, які застосовують інгібітори протеази
Рифапентин (Rifapentine)	* Лише для лікування латентної форми туберкульозу
<b>3. Протигрибкові лікарські засоби</b>	
Вориконазол (Voriconazole)	* Для лікування хронічного легеневого аспергільозу та гострого інвазивного аспергільозу
Ітраконазол (Itraconazole)	* Для лікування хронічного легеневого аспергільозу, гістоплазмозу, споротріхозу, параккокцидіоідомікозу, мікозів, викликаних <i>T. marneffe</i> та хромобластомікозом; та профілактика гістоплазмозу та інфекцій, викликаних <i>T. marneffe</i> у хворих на СНІД
<b>4. Противірусні лікарські засоби</b>	
<b>Антиретровірусні лікарські засоби</b>	
<b>Ненуклеозидні інгібітори зворотної транскриптази</b>	
Ефавіренз (Efavirenz)	<input checked="" type="checkbox"/> >3 років або >10 кг
<b>Інгібітори протеази</b>	
Атазанавір (Atazanavir)	<input checked="" type="checkbox"/> >25 кг
Саквінавір (Saquinavir)	<input checked="" type="checkbox"/> >25 кг * Застосовується у разі неможливості медичного застосування інших лікарських засобів
<b>Інгібітори інтегрази</b>	
Ралтегравір (Raltegravir)	* Для використання у вагітних жінок, а також у терапії другої лінії відповідно до клінічних настанов
<b>Інші противірусні засоби</b>	
Озельтамівір (Oseltamivir)	* Для лікування потенційно важких або ускладнених захворювань у разі підтвердженої або передбачуваної вірусної інфекції грипу відповідно до основних принципів лікування
Рибавірин (Ribavirin)	* Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С
<b>Лікарські засоби проти гепатиту</b>	

<b>Інші протівірусні засоби</b>		
Рибавірин (Ribavirin)	* Для лікування вірусної геморагічної лихоманки і в поєднанні з пегільованим інтерфероном для лікування гепатиту С	
<b>Додатковий перелік</b>		
Пегільований інтерферон альфа (2a або 2b) (Pegylated interferon alfa (2a or 2b))	* Для медичного застосування в комбінації з рибавірином	
<b>5. Засоби для лікування протозойних інфекцій</b>		
<b>Засоби для лікування амебіазу та лямбліозу</b>		
Дилоксанід (Diloxanide)	<input checked="" type="checkbox"/> >25 кг	
<b>Засоби для лікування малярії</b>		
<b>Для лікування малярії</b>		
Амодиахін (Amodiaquine)	* Для медичного застосування у комбінації з артезунатом 50 мг	
Артеметер (Artemether)	* Для лікування важкої малярії	
Артеметер+Лумефантрін (Artemether+Lumefantrine)	* Не рекомендований у першому триместрі вагітності або дітям вагою до 5 кг	
Артезунат (Artesunate)	* Для медичного застосування в комбінації з амодиахіном, або мефлохіном, або сульфадоксином + піриметаміном	
	Ін'єкції	* Для лікування тяжкої форми малярії
	Ректальна лікарська форма	* Лише для попереднього лікування важкої малярії; пацієнти повинні бути направлені до відповідного медичного закладу для подальшого спостереження
Артезунат+Амодиахін (Artesunate+Amodiaquine)	* Комбінації, що забезпечують необхідні цільові дози, такі як 153 мг або 200 мг (у вигляді гідрохлориду) разом з 50 мг артезунату, можуть бути альтернативою	
Хлорохін (Chloroquine)	* Лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax (у вигляді фосфату або сульфату)	
Доксициклін (Doxycycline)	* Для медичного застосування лише в поєднанні з хініном	
Мефлохін (Mefloquine)	* Для медичного застосування у комбінації з артезунатом 50 мг	
Примахін (Primaquine)	* Використовується впродовж 14 днів лише для лікування інфекції, спричиненої P.vivax та	

	P.ovale
Хінін (Quinine)	* Лише для лікування тяжкої малярії при медичному застосуванні у комбінації з доксицикліном
Сульфадоксин+Піриметамін (Sulfadoxine+Pyrimethamine)	* Для медичного застосування лише у комбінації з артезунатом 50 мг
<b>Для профілактики малярії</b>	
Хлорохін (Chloroquine)	* Для лікування інфекції, що спричинена P.vivax
Доксициклін (Doxycycline)	<input checked="" type="checkbox"/> >8 років
Мефлохін (Mefloquine)	<input checked="" type="checkbox"/> >5 кг або >3 місяців
Прогуаніл (Proguanil)	* Для медичного застосування тільки у комбінації з хлорохіном
<b>VIII. Антинеопластичні та імуносупресивні лікарські засоби</b>	
<b>1. Імуносупресивні лікарські засоби</b>	
<i>Додатковий перелік</i>	
Такролімус (Tacrolimus)	* Для використання в трансплантології
<b>2. Цитотоксичні та ад'ювантні лікарські засоби</b>	
<i>Додатковий перелік</i>	
Повністю трансретиноева кислота (All-trans retinoid acid (ATRA)) Третиноїн (Tretinoin)	* Для лікування гострої промієлоцитарної лейкемії
Бендамустин (Bendamustine)	* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми
Блеоміцин (Bleomycin)	* Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок
Кальцію фолінат (Calcium folinate)	* Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, гестаційної трофобластичної неоплазії, метастатичного колоректального раку, остеосаркоми, лімфоми Беркітта
Капецитабін (Capecitabine)	* Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного раку молочної залози, метастатичного колоректального раку
Карбоплатин (Carboplatin)	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, епітеліального раку яєчників, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, ретинобластоми.
Хлорамбуцил (Chlorambucil)	* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії

<i>Цисплатин (Cisplatin)</i>	* Для лікування раку шийки матки (як радіо-сенсibilізатор), раку голови і шиї (як радіо-сенсibilізатор), раку носоглотки (як радіо-сенсibilізатор), недрібноклітинного раку легень, остеосаркоми, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок
<i>Циклофосфамід (Cyclophosphamide)</i>	* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта, метастатичного раку молочної залози
<i>Цитарабін (Cytarabine)</i>	* Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, лімфоми Беркітта
<i>Дакарбазин (Dacarbazine)</i>	* Для лікування лімфоми Ходжкіна
<i>Дактиномицин (Dactinomycin)</i>	* Для лікування гестаційної трофобластичної неоплазії, рабдоміосаркоми, пухлини Вільмса
<i>Даунорубіцин (Daunorubicin)</i>	* Для лікування гострої мієлобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії, гострої лімфобластної лейкемії
<i>Доцетаксел (Docetaxel)</i>	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, метастатичного раку передміхурової залози
<i>Доксорубіцин (Doxorubicin)</i>	* Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, ранньої стадії раку молочної залози, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, метастатичного раку молочної залози, остеосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта
<i>Етопозид (Etoposide)</i>	* Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, ретинобластоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта

<i>Флударабін (Fludarabine)</i>	* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії
<i>Фторурацил (Fluorouracil)</i>	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, ранньої стадії раку товстої кишки, ранньої стадії раку прямої кишки, метастатичного колоректального раку, раку носоглотки
<i>Філграстім (Filgrastim)</i>	* Для первинної профілактики у пацієнтів з високим ризиком розвитку фебрильної нейтропенії, пов'язаної з мієлотоксичністю хіміотерапії; вторинної профілактики пацієнтів, у яких розвинулась нейтропенія, пов'язана з мієлотоксичністю хіміотерапії; полегшення введення дози подальшого курсу хіміотерапії
<i>Гемцитабін (Gemcitabine)</i>	* Для лікування епітеліального раку яєчників, недрібноклітинного раку легень
<i>Іфосфамід (Ifosfamide)</i>	* Для лікування зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників, остеосаркоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга
<i>Іматиніб (Imatinib)</i>	* Для лікування хронічної мієлоїдної лейкемії, гастроінтестинальної стромальної пухлини шлунка
<i>Іринотекан (Irinotecan)</i>	* Для лікування метастатичного колоректального раку
<i>Меркаптопурин (Mercaptopurine)</i>	* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії
<i>Метотрексат (Methotrexate)</i>	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, гестаційної трофобластичної неоплазії, остеосаркоми, гострої лімфобластної лейкемії, гострої промієлоцитарної лейкемії
<i>Оксаліплатин (Oxaliplatin)</i>	* Для лікування ранньої стадії раку товстої кишки, метастатичного колоректального раку
<i>Паклітаксел (Paclitaxel)</i>	* Для лікування епітеліального раку яєчників, ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози, саркоми Капоші, раку носоглотки, недрібноклітинного раку легень, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників



<i>Ритуксимаб (Rituximab)</i>	* Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, хронічної лімфоцитарної лейкемії, фолікулярної лімфоми	
<i>Вінбластин (Vinblastine)</i>	* Для лікування лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчок, зародковоклітинної (герміногенної) пухлини яєчників	
<i>Вінкристин (Vincristine)</i>	* Для лікування дифузної В-великоклітинної лімфоми, гестаційної трофобластичної неоплазії, лімфоми Ходжкіна, саркоми Капоші, фолікулярної лімфоми, ретинобластоми, рабдоміосаркоми, саркоми Юінга, гострої лімфобластної лейкемії, пухлини Вільмса, лімфоми Беркітта	
<i>Вінорелбін (Vinorelbine)</i>	* Для лікування недрібноклітинного раку легень, метастатичного раку молочної залози	
<i>Бортезоміб (Bortezomib)</i>	* Множинна мієлома	
<i>Гозерелін (Goserelin)</i>	Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 3,6 мг	* Рак молочної залози та рак передміхурової залози
	Капсули для підшкірного введення пролонгованої дії: 10,8 мг	* Рак передміхурової залози
<i>Екземестан (Exemestane)</i>	* Рак молочної залози	
<i>Епірубіцин (Epirubicin)</i>	* Рак сечового міхура, рак молочної залози, рак шлунку, злоякісні лімфоми <input checked="" type="checkbox"/> >18 років	
<i>Ідарубіцин (Idarubicin)</i>	* Гостра мієлоїдна лейкемія, гостра лімфобластна лейкемія у дорослих	
	Капсули: 10 мг	<input checked="" type="checkbox"/> Лише для дорослих
<i>Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)</i>	* Меланома, саркома Капоші, асоційована з ВІЛ, метастатичний рак нирки, нейроендокринні пухлини	
<i>Лейпрорелін (Leuprorelin)</i>	Порошок для приготування розчину для підшкірних ін'єкцій: 7,5 мг; 22,5 мг; 45 мг Імплантат: 3,6 мг; 5	* Рак передміхурової залози

	мг	
	Ліофілізат для суспензії для ін'єкцій: 3,75 мг	* Рак молочної залози
Летрозол (Letrozole)	* Рак молочної залози	
Мелфалан (Melphalan)	* Множинна мієлома; істинна поліцитемія; IV стадія нейробластоми у дітей	
Мітоксантрон (Mitoxantrone)	* Поширений гормонорефрактерний рак передміхурової залози, гостра мелоїдна лейкемія (ГМЛ), неходжкінські лімфоми та гострий нелімфобластний лейкоз (ГНЛ)	
Темозоломід (Temozolomide)	* Злоякісна гліома (мультиформна гліобластома або анапластична астроцитома при наявності рецидиву або прогресування захворювання після стандартної терапії) <input checked="" type="checkbox"/> > 3 років	
Топотекан (Topotecan)	* Метастатичний рак яєчників, рецидивний дрібноклітинний рак легені, рецидивний рак шийки матки <input checked="" type="checkbox"/> > 18 років	
Трипторелін (Triptorelin)	* Рак передміхурової залози	
Золедронова кислота (Zoledronic acid)	* Захворювання кісток, пов'язані із злоякісними пухлинами	
<b>3. Гормони та антигормони</b>		
<b>Додатковий перелік</b>		
Анастрозол (Anastrozole)	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози	
Бікалутамід (Bicalutamide)	* Для лікування метастатичного раку передміхурової залози	
Дексаметазон (Dexamethasone)	* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії	
Гідрокортизон (Hydrocortisone)	* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії	
Метилпреднізолон (Methylprednisolone)	* Для лікування гострої лімфобластної лейкемії	
Преднізолон (Prednisolone)	* Для лікування хронічної лімфоцитарної лейкемії, дифузної В-великоклітинної лімфоми, лімфоми Ходжкіна, фолікулярної лімфоми, гострої лімфобластної лейкемії, лімфоми Беркітта	

Тамоксифен (Tamoxifen)	* Для лікування ранньої стадії раку молочної залози, метастатичного раку молочної залози	
<b>X. Лікарські засоби, що впливають на кров</b>		
<b>1. Антианемічні лікарські засоби</b>		
Заліза сіль + Фолієва кислота (Ferrous salt + Folic acid)	* Для медичного застосування у вагітних	
Фолієва кислота (Folic acid)	Таблетки: 400 мкг	* Для профілактики та лікування перших проявів дефектів нервової трубки
<b>XI. Препарати крові та плазмозамінні лікарські засоби людського походження</b>		
<b>2. Препарати на основі (похідні) плазми крові</b>		
<i>Додатковий перелік</i>		
Імуноглобулін людини нормальний (Normal immunoglobulin)	Внутрішньом'язове введення: 16% розчин протеїну. Підшкірне введення: 15%, 16% розчин протеїну	* Призначений для первинного імунодефіциту (підшкірне та внутрішньом'язове введення)
	Внутрішньовенне введення: 5%, 10% розчин протеїну	** Призначений для первинного імунодефіциту та хвороби Кавасаки (внутрішньовенне введення)
<b>XII. Лікарські засоби для лікування серцево-судинної системи</b>		
<b>3. Антигіпертензивні лікарські засоби</b>		
Гідралазин (Hydralazine)	* Лише для лікування тяжкої гіпертензії, індукованої вагітністю. Не рекомендується при есенціальній гіпертензії через наявність суттєвіших доказів ефективності та безпеки інших лікарських засобів	
Метилдопа (Methyldopa)	* Лише для медичного застосування при гіпертензії у вагітних. Медичне застосування при лікуванні гіпертонічної хвороби не рекомендується через наявність значної кількості даних про вищу ефективність і безпеку інших лікарських засобів	
Дилтіазем (Diltiazem)	* Для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією	
Силденафіл (Sildenafil)	* Для лікування пацієнтів із легеневою гіпертензією	

<b>6. Гіполіпідемічні лікарські засоби</b>	
Симвастатин (Simvastatin)	* Для медичного застосування у пацієнтів з високим ступенем ризику
<b>XIII. Дерматологічні лікарські засоби (місцевого застосування)</b>	
<b>2. Антибактеріальні лікарські засоби</b>	
Сульфадіазин срібла (Silver sulfadiazine)	<input checked="" type="checkbox"/> >2 місяців
<b>3. Протизапальні та протисвербіжні лікарські засоби</b>	
Бетаметазон (Betamethasone)	<input checked="" type="checkbox"/> Не рекомендується немовлятам
<b>5. Лікарські засоби для лікування педикульозу</b>	
Бензилбензоат (Benzyl benzoate)	<input checked="" type="checkbox"/> >2 років
<b>6. Лікарські засоби для лікування ран та виразкових уражень</b>	
Декспантенол (Dexpanthenol)	* Загоєння та епітелізація шкіри у пацієнтів з бульозним епідермолізом
<b>XIV. Лікарські засоби для діагностики</b>	
<b>2. Рентгеноконтрасні лікарські засоби</b>	
Йопамідол (Iopamidol)	* Хворим із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями
<b>XVII. Лікарські засоби, що впливають на функцію шлунково-кишкового тракту</b>	
<b>3. Антиеметики</b>	
<i>Додатковий перелік</i>	
Метоклопрамід (Metoclopramide)	<input checked="" type="checkbox"/> Не застосовується для новонароджених
Ондансетрон (Ondansetron)	<input checked="" type="checkbox"/> >1 місяця
<b>6. Лікарські засоби, що застосовуються при діарей</b>	
<b>Лікарські засоби від діарей</b>	
Сульфат цинку (Zinc sulfate)	* При гострій діарей застосовується як доповнення до солей для пероральної регідрації
<b>XVIII. Гормони, інші лікарські засоби, що використовуються при ендокринних захворюваннях</b>	
<b>3. Контрацептиви</b>	
* Для жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю (стосується всіх МНН з групи)	
<b>Інтравагінальні контрацептиви</b>	
Прогестеронове вагінальне кільце	* Для жінок, що годують грудьми не менше 4 разів на день

(Progesterone vaginal ring)	
<b>5. Інсуліни та інші ліки, які використовуються для лікування діабету</b>	
Глібенкламід (Glibenclamide) може бути використаний як альтернатива Гліклазиду (Gliclazide)	* Не застосовується у пацієнтів старше 60 років
<b>XIX. Імунобіологічні лікарські засоби</b>	
<b>2. Сироватки та імуноглобуліни</b>	
Протиотрутний імуноглобулін (Anti-venom immunoglobulin)	* Точний тип визначається залежно від клінічної ситуації
<b>4. Інтерферони</b>	
Інтерферон альфа-2b (Interferon alfa-2b)	* Меланома, саркома Капоші, асоційована з ВІЛ, метастатичний рак нирки, нейроендокринні пухлини
Ліофілізат для приготування розчину для ін'єкцій: 3 млн. МО, 6 млн. МО	** Для лікування дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит
Інтерферон бета 1-a (Interferon beta-1a)	* Для лікування хворих на розсіяний склероз
Інтерферон бета 1-b (Interferon beta-1b)	* Для лікування хворих на розсіяний склероз
<b>XXI. Офтальмологічні лікарські засоби</b>	
<b>3. Місцеві анестетики</b>	
Тетракаїн (Tetracaine)	<input checked="" type="checkbox"/> Не показаний для недоношених новонароджених
<b>5. Мідріатики</b>	
Атропін (Atropine)	<input checked="" type="checkbox"/> >3 місяців
<b>XXII. Лікарські засоби, що впливають на міометрій</b>	
<i>Додатковий перелік</i>	
Міфепристон (Mifepristone) – Мізопропростол (Misoprostol)	* Медичне застосування потребує ретельного медичного нагляду
<b>XXIV. Лікарські засоби для лікування психічних і поведінкових розладів</b>	
<b>2. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування порушення настрою</b>	
<b>Лікарські засоби, що застосовуються при депресивних розладах</b>	
Флуоксетин (Fluoxetine)	<input checked="" type="checkbox"/> >8 років

<b>XXVIII. Лікарські засоби для лікування вуха, горла та носа</b>	
Ксилометазолін (Xylometazoline)	<input checked="" type="checkbox"/> Не застосовується для дітей віком до 3 місяців
<b>XXXI. Лікарські засоби, що застосовуються при наданні екстреної (невідкладної) медичної допомоги</b>	
Метамізол натрію (Metamizole sodium)	* Для однократного введення при наданні невідкладної медичної допомоги
Ондансетрон (Ondansetron) <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> >1 місяця
Ранітидин (Ranitidine)	* Як альтернатива омепразолу
Терліпресин (Terlipressin)	* Кровотечі з розширених вен стравоходу