

№ показника впливу	Стандартний показник	Базове значення			2021		2022		2023		Коментарі
		Чисельник #N Знаменник #D	%	Рік	Чисельник #N Знаменник #D	%	Чисельник #N Знаменник #D	%	Чисельник #N Знаменник #D	%	
1	HIV 1-4 Кількість пов'язаних зі СНІДом смертей на 100 000 населення	9,4		2018	7,00		6,40		5,80		Показник розраховується на основі фактичних даних про кількість смертей від захворювання, спричиненого ВІЛ на 100 000 осіб (коди ICD-10 B20-B24). Чисельник: Фактична кількість людей, які померли від причин пов'язаних зі СНІДом.
2	HIV 1-9e <sup>00</sup> Відсоток чоловіків, які практикують секс із чоловіками й живуть з ВІЛ		7,50%	2017		7,00%				6,50%	Поширеність розраховується як середній рівень на основі результатів ІБІД серед чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками (використовуючи методи RDS для вибору проб). Базовий показник: ІБІД 2017 року серед ЧСЧ в 27 містах України. Наступне дослідження ІВБС розпочнеться у 2021 році.
3	HIV 1-9e <sup>00</sup> Відсоток трансгендерних осіб, які живуть з ВІЛ			2019							Базове значення буде визначений на основі ІВІД серед транс-людей, розпочато у 2019 році. Дані ІВІД, яке триває, будуть доступні у 2020 році. Дослідження не включатиме, серед іншого, Крим, Севастополь та невідконтрольні території (NGCA). Одноразово зі збором даних в межах ІБІД збиратимуться дані для оцінки кількості трансгендерних осіб в Україні.
4	HIV 1-10 <sup>00</sup> Відсоток осіб, які надають сексуальні послуги за винагороду й живуть з ВІЛ		5,20%	2017		5,00%				4,70%	Поширеність обчислюється як середній рівень на основі результатів ІБІД серед секс-працівників (з використанням методу RDS для вибору проб). Базовий рівень: ІБІД 2017 серед СІУ в 25 містах України. Наступний раунд ІБІД розпочнеться у 2021 році.
5	HIV 1-11 <sup>00</sup> Відсоток людей, які вживають ін'єкційні наркотики й живуть з ВІЛ		22,50%	2017				22,00%			Поширеність розраховується як середній рівень на основі результатів ІБІД серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики, використовуючи методи RDS для вибірки. Базове значення ІБІД 2017 серед людей, які вживають ін'єкційні наркотики в 30 містах України. Наступне дослідження ІБІД розпочнеться у 2020 році після закінчення карантинних обмежень.
6	HIV 1-12 Відсоток інших вразливих груп населення (вкваліти), які живуть з ВІЛ		8,90%	2019				8,00%			Поширеність розраховується на основі результатів ІБІД серед уязвлених із застосуванням стратифікованого випадкового методу вибірки. Базовим ІБІД було новомасштабне дослідження рівня ВІЛ-інфекції серед уязвлених у 26 колоніях у 12 регіонах. Дослідження охоплювало лише підконтрольні території України. Наступний раунд ІБІД планується в 2022 році. Цілі розрахунки, засновані на даних епідеміологів.
7	ТВ HIV 1-1 Рівень смертності від ТВ/ВІЛ на 100 000 населення	3,40		2019	3,20		2,90		2,60		Показник розраховується на основі даних про кількість смертей хворих на ко-інфекцію ВІЛ/туберкульоз на 100 000 осіб (ICD-10, код B20.0). Чисельник: Фактична кількість ВІЛ-позитивних людей, які помирають від ко-інфекції ВІЛ-інфекції з туберкульозом як причини смерті. Знаменник: Середньорічна чисельність населення країни у звітному році. Джерело даних Реєстрація смерті в Україні проводиться в органах реєстрації актів цивільного стану, дані Державної служби статистики, таким чином, дані збираються по всій країні.
8	ТВ 1-3 <sup>00</sup> Рівень смертності від ТВ на 100 000 населення	8,70		2019	8,10		7,50		6,80		Чисельник: Фактична кількість смертей, спричинених туберкульозом (усі форми) у ВІЛ-негативних людей на рік, згідно з визначенням МКБ-10. Знаменник: Середньорічна чисельність населення країни у звітному році. Джерело даних Реєстрація смерті в Україні здійснюється в органах реєстрації актів цивільного стану, дані Державної служби статистики. Форми реєстрації та звітності для збору даних щодо цього показника, а також інструкції щодо звітності затверджуються Міністерством юстиції, таким чином, дані збираються по всій країні. За даними Державної служби статистики У 2019 році зафіксовано 3418 смертей, спричинених туберкульозом, 302 з них зафіксовано на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей. Дані не включають інформацію з невідконтрольних територій України та Криму. Коефіцієнт смертності в 2019 році становить 8,7 і був обчислений без урахування Донецької та Луганської областей (3116 випадків на 35683312 осіб). Середньорічне населення України (GCA + NGCA-AR Криму) у 2019 році становило 4215200 осіб. Невідповідності між цілями ІСІП та цілями ПН зумовлені тимчасовими оцінками тенденцій смертності від туберкульозу для України та очікуваннями результатів національного обстеження щодо поширеності.
9	ТВ 1-4 <sup>00</sup> Поширеність РР-ТБ та/або МР-ТБ серед пацієнтів з ТБ (нові випадки): частка нових випадків захворюваності на РР-ТБ та/або МР-ТБ	3 438,00	27,22%	2019		26,00%		25,00%		24,00%	Цей показник показує поширеність РР-ТБ та / або МР-ТБ серед нових випадків захворювання на туберкульоз. Чисельник: Кількість нових випадків РР-ТБ та / або МР-ТБ. Знаменник: Загальна кількість нових випадків захворювання на туберкульоз із результатами DST / Xpert. Дані базового показника не включають інформацію про випадки захворювання на туберкульоз з Криму, Севастополя та ІНКА. У 2019 році з 5727 нових випадків було 2498 хворих з РР-ТБ та / або МР-ТБ.
10	ТВ 1 - other 1: Поширеність РР-ТБ та/або МР-ТБ серед пацієнтів з ТБ на повторному лікуванні: частка випадків повторного лікування випадків з РР-ТБ та/або МР-ТБ	2 498,00	42,87%	2019		45,00%		45,00%		45,00%	Показник характеризує поширеність РР-ТБ та / або МР-ТБ серед раніше пролікованих випадків туберкульозу. Чисельник: Кількість раніше пролікованих випадків туберкульозу з РР-ТБ та / або МР-ТБ. Знаменник: Загальна кількість раніше пролікованих випадків туберкульозу з результатами DST/Xpert. Дані збираються за допомогою статистичних форм ТВ 07, ТВ 08. У базові дані не входять інформації про випадки захворювання на туберкульоз з Криму, Севастополя та ІНКА. У 2018 році частка рифампіцинорезистентних форм туберкульозу та / або МР-туберкульозу серед раніше пролікованих хворих на туберкульоз становила 46,44% (2888 випадків туберкульозу РР-ТБ / МР-ТБ із 6219 випадків, які раніше лікували туберкульоз). У 2019 році було зареєстровано 2498 випадків РР-ТБ та / або МР-ТБ з 5827 раніше пролікованих випадків туберкульозу.